



НАПРАВЛЕНИЯ НАШЕГО ЦЕНТРА

» Стационарные отделения:

- Травматология и ортопедия;
- Вертебрология;
- Медицинская реабилитация;
- Гинекология;
- Урология;
- Оториноларингология.

» Дневной стационар

» Поликлиника

» Эндоскопическая диагностика

» Лабораторная диагностика

» Функциональная диагностика:

- Исследование сердечно-сосудистой системы;
- Суточное мониторирование АД (СМАД);
- Нагрузочное кардиологическое тестирование (тредмил, ВЭМ);
- Исследование нервной системы (ЭНМНГ, ЭЭГ);
- Исследование дыхательной системы (ФВД);
- Исследование опорно-двигательной системы;
- Ультразвуковая диагностика и др.

» Лучевая диагностика:


- Компьютерная томография (КТ);
- Конусно-лучевая компьютерная томография (КЛКТ);
- Магнитно-резонансная томография (МРТ);
- Рентгенодиагностика;
- Маммография;
- Рентгеновская остеоденситометрия.

Квалифицированные специалисты
Современное оборудование
Комфорт для пациентов

СХЕМА ПРОЕЗДА

140 км от
Екатеринбурга

Свердловская область,
г. Нижний Тагил,
Уральский проспект, 55



ОТ АВТО- И Ж/Д ВОКЗАЛА

АВТОБУСЫ
№ 26, 32

ТРАМВАИ
№ 15, 17

Остановка:
«Уральский клинический центр»
Уральский проспект, 55



ural-clinic.ru



VK



Одноклассники



Telegram

ЕДИНАЯ СЛУЖБА РЕГИСТРАТУРЫ:

+7 (3435) 444-555

reg@ural-clinic.ru

ural-clinic.ru

info@ural-clinic.ru



Уральский клинический
лечебно-реабилитационный
центр им. В.В.Тетюхина

ОТОРИНО
ЛАРИНГО
ЛОГИЯ




ТИМПАНОПЛАСТИКА

ОТДЕЛЕНИЕ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ

КОНДУКТИВНАЯ ТУГОУХОСТЬ

Кондуктивная потеря слуха — это нарушение, при котором звуковые волны не могут эффективно проходить через наружное или среднее ухо к внутреннему из-за физического препятствия (например, серной пробки, жидкости, воспаления, травмы барабанной перепонки), приводящее к приглушенному восприятию звуков и речи.

Проявления включают «заложенность» ушей, трудности с восприятием речи, а лечение может варьироваться от консервативного до хирургического, в зависимости от причины.



ЧТО ТАКОЕ ТИМПАНОПЛАСТИКА?

Тимпаноластика — операция по восстановлению барабанной перепонки и структур среднего уха, направленная на улучшение или возвращение слуха, а также на устранение хронических инфекций. Она проводится при перфорации барабанной перепонки, хроническом среднем отите, снижении слуха из-за повреждений или рубцовых изменений в среднем ухе.



МИКРОЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ В УКЛРЦ

Особенностью хирургического лечения ЛОР-заболеваний является использование эндоскопического оборудования и операционного микроскопа. Все операции выполняются в операционной, оснащенной современным оборудованием ведущих фирм.

Тимпаноластика проводится под общим наркозом, что позволяет сделать проводимые манипуляции комфортными для пациента.

РЕАБИЛИТАЦИЯ ПОСЛЕ ТИМПАНОПЛАСТИКИ

Восстановление происходит постепенно в течение месяца. Во избежание инфекций запрещено посещать водоемы, бассейны, принимать ванну. Необходимо ограничить физическую нагрузку. До полного восстановления также необходимо отложить использование наушников, посещение шумных мероприятий и авиаперелеты.

**ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО ТЕЛЕФОНУ:**

8 (3435) 42-99-03 вн. 6128

КАК ПОПАСТЬ НА ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В УКЛРЦ



Шаг №1. Получение направления

Пациент записывается на прием к врачу-оториноларингологу и получает заключение о необходимости оперативного лечения



Шаг №2. Внесение в лист ожидания

При установленном диагнозе «Кондуктивная потеря слуха» пациент обращается в УКЛРЦ в кабинет № 162 с необходимым пакетом документов: МСКТ пирамид височных костей и заключение оториноларинголога, в котором прописан код диагноза МКБ-10: H90.0, H90.1, H90.2



Шаг №3. Врачебная комиссия

Документы и результаты обследований рассматриваются оперирующим врачом. При положительном решении об оперативном лечении пациенту выдается персональное приглашение на госпитализацию с назначенной датой и перечнем необходимых предоперационных обследований



Шаг №4. Госпитализация

Госпитализация осуществляется в назначенный день при наличии результатов предгоспитализационных обследований и отсутствии медицинских противопоказаний

